

### ¿Qué es TRAMETINIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinasa) que impide la diseminación de células tumorales.

### ¿Qué dosis tomar?

Debe tomar su dosis prescrita una vez al día.

### ¿Cómo debe tomar TRAMETINIB?

- Deberá tomar la dosis indicada **sin alimentos (una hora antes o dos horas después de las comidas) una vez al día**, siempre a la misma hora.
- Lave sus manos siempre antes y después de manipular el medicamento
- No fraccione ni mastique los comprimidos.

### ¿Cómo se debe almacenar TRAMETINIB?

- Se debe conservar en nevera (2-8°C). **NUNCA EN CONGELADOR.**
- Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja. La fecha de vencimiento es el último día del mes que indica.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

La dosis olvidada se puede tomar **si quedan más de 12 horas para la próxima dosis de lo contrario omita la dosis olvidada** y reanude la toma habitual al día siguiente.

### Precauciones Especiales

- No done Sangre mientras este en el tratamiento.
- Evite conducir y realizar otras tareas o acciones que requieran que esté alerta hasta que vea cómo le afecta este medicamento.
- Es posible que tenga más posibilidades de contraer una infección. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas con infecciones, resfriados o gripe.
- Puede sangrar más fácilmente. Tenga cuidado y evite lesiones. Utilice un cepillo de dientes suave y tenga precaución al momento de afeitarse.

### ¿Cuándo consultar al médico?

- **Signos de una reacción alérgica**, como sarpullido; urticaria; Comezón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; opresión en el pecho o la garganta; dificultad para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, cara, labios, lengua o garganta.
- **Signos de infección** como fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy fuerte, dolor de oídos o de los senos nasales, tos, más esputo o cambio de color del esputo, dolor al orinar, llagas en la boca o una herida que no cicatriza.
- **Signos de sangrado** como vomitar o toser sangre; vómito que parece posos de café; sangre en la orina; heces negras, rojas o alquitranadas; sangrado de las encías; sangrado vaginal anormal; moretones sin causa o que se agrandan; o sangrado que no puede detener.
- **Signos de problemas renales** como incapacidad para orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un gran aumento de peso.
- **Signos de problemas de líquidos y electrolitos** como cambios de humor, confusión, dolor o debilidad muscular, latidos cardíacos anormales, mareos o desmayos muy intensos, latidos cardíacos rápidos, más sed, convulsiones, sensación de cansancio o debilidad, falta de hambre, incapacidad para orinar o cambios en la cantidad de orina producida, boca seca, ojos secos o malestar estomacal muy fuerte o vómitos.
- **Signos de niveles altos de azúcar en sangre** como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar con más frecuencia, enrojecimiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- **Signos de problemas pulmonares o respiratorios** como falta de aire u otros problemas para respirar, tos o fiebre.
- **Signos de niveles bajos de tiroides** como estreñimiento; incapacidad de soportar el frío; problemas de memoria; cambios de humor; o una sensación de ardor, entumecimiento u hormigueo que no es normal.
- Hinchazón de brazos o piernas.
- Temblores.

### ¿Dónde comunicarse en caso de alguna duda relacionada con este medicamento o reacción adversa?

Escribir al correo electrónico: [quimico.asistencial@sumimedical.com](mailto:quimico.asistencial@sumimedical.com)