

Uso seguro de los medicamentos

Empagliflozina y Dapagliflozina

¿Para qué sirven estos medicamentos?

Empagliflozina y Dapagliflozina son medicamentos utilizados principalmente en personas con **Diabetes tipo 2**. Sus beneficios **van más allá del control del azúcar en la sangre**:

- Ayudan a bajar los niveles de glucosa.
- Disminuyen el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca.
- Pueden proteger los riñones y retrasar el daño renal.
- Contribuyen a una pérdida de peso leve a moderada.



En algunos casos, también se usan en personas sin diabetes que tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, siempre bajo control médico.



¿Cómo debo tomar estos medicamentos?

- Tómalo una vez al día, a la misma hora, con o sin alimentos.
- Si olvidas una dosis, no tomes el doble. Solo espera a la próxima dosis habitual.



Recomendaciones para un uso seguro

1

Mantente bien hidratado



Bebe agua durante el día. En días calurosos o si haces ejercicio, **umenta tu consumo de líquidos** para evitar deshidratación.

Evita ayunos prolongados o dietas extremas

2



Estos medicamentos pueden **umentar el riesgo** de una complicación poco común llamada **cetoacidosis diabética**, incluso si el azúcar no está muy alto. Come de manera regular y saludable.

3

Cuida tu higiene íntima



Estos medicamentos pueden **umentar el riesgo** de infecciones en vías urinarias o genitales, especialmente infecciones por hongos. Mantén una buena higiene y **consulta al médico si sientes ardor, picazón, mal olor** o notas secreciones inusuales.

No dejes el medicamento por tu cuenta

4



Aunque te sientas bien, **no suspendas el tratamiento** sin hablar con tu médico. La suspensión sin control puede empeorar el nivel de azúcar y perder los beneficios para el corazón y los riñones.

Consulta con tu médico si presentas alguno de estos síntomas:

- Infecciones urinarias frecuentes o dolorosas.
- Náuseas intensas o vómitos.
- Dolor abdominal o respiración rápida y profunda.
- Mareos al levantarte o sensación de desmayo.
- Signos de deshidratación: boca muy seca, debilidad, orina muy oscura o escasa.



¡Recuerda! Estamos aquí para apoyarte. ¡No dudes en preguntar a tu equipo de salud!



También puedes escribirnos y reportar cualquier inconveniente con estos medicamentos al programa de farmacovigilancia, correo:

farmacovigilancia@sumimedical.com

¡Tu seguridad nuestra prioridad!

sumi
medical

¡Cuidamos tu salud,
cuidamos tu vida!